

GUÍA DE APLICACIÓN  
ALBAHACA




| TRATAMIENTO DE SEMILLA                   | 4 HOJAS VERADADERAS        | 20 HOJAS VERADADERAS | ANTES DE COSECHA    | OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES                                                                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FERTUM ® Root<br>40 cc por kg de semilla |                            |                      |                     | Tratar las semillas con FERTUM Root o Germinal sin diluir. 40 cc por kg de semilla. Estimula la germinación.                      |
|                                          | FERTUM ® Foliar<br>4 L/ha. |                      |                     | Para el desarrollo del cultivo aplicar la dosis con 400 L por ha. Mínimo 200 L por ha. Vigoriza el desarrollo foliar.             |
|                                          |                            | CALCIBORO<br>2 L/ha  | MAXHIERRO<br>2 L/ha | De ser necesario usar CalciBoro para la firmeza del cultivo y Usar MaxHierro 7 días antes de la cosecha, para el verdeo de hojas. |

**OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:**

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.

| 12 HOJAS VERDADERAS   | 14 HOJAS VERDADERAS | 20 HOJAS VERDADERAS  | OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES                                                                                    |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALCYBORO<br>1-2 L/ha |                     |                      | Para la fotosíntesis y consistencia de los tejidos.                                                            |
|                       | COPPER<br>1/ha      |                      | Prevención de enfermedades fungosas.<br>Mejora la resistencia a enfermedades.                                  |
| MAGNESSIUM<br>2 L/ha  |                     | MAGNESSIUM<br>2 L/ha | Para la fotosíntesis y consistencia de los tejidos.<br>Con 20 hojas verdaderas ayuda a la firmeza del cultivo. |
|                       |                     |                      |                                                                                                                |
|                       |                     |                      |                                                                                                                |
|                       |                     |                      |                                                                                                                |

**AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO \***



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



**ADVERTENCIA:** Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

**RECOMENDACIÓN:** En semillero atomizar FERTUM Root, 2 L/ha en post emergencia apenas se presente una superficie foliar para la absorción. Repetir 1-3 días antes del trasplante.

\* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM ® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

**NOTA:** FERTUM ® Root se vende en Chile como FARTUM ® Germinal. FARTUM ® es marca comercial en Chile y FERTUM ® es marca comercial en los otros países.

[contacto@fartum.cl](mailto:contacto@fartum.cl)

[www.fartum.cl](http://www.fartum.cl)

[info@fertum.cl](mailto:info@fertum.cl)

[www.fertum.cl](http://www.fertum.cl)