




INICIO DE FLOR	CAÍDA DE PETALOS FRUTO CUAJADO	BROTE DE 10 - 15 CM	DESARROLLO DE FRUTO	POST COSECHA marzo (Hemisferio Sur)	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® Foliar 3 L/ha - 750 cc	FERTUM® Foliar 3 L/ha - 750 cc		FERTUM® Foliar 3 L/ha - 750 cc		Con 40 % de floración. Repetir otras 2 veces con intervalos de 15 días. Mejora la cuaja
		ZINCMANGANESO 1 L/ha - 60 cc			Desde brote de 10-15 cm. Repetir otras 2 veces, cada 15 días Promueve el desarrollo de frutos y brotes.
				MAXZINC 1 L/ha - 150 cc	Aplicar con hojas activas solo si los niveles de análisis foliar está bajo 25 ppm
				MAXBORO 1 L/ha - 150 cc	Aplicar en hojas activas solo si los niveles están bajo en Boro.

OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:

INICIO DE FLOR	40 DÍAS DESPUÉS DE CUAJA	POST COSECHA	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
CALCIBORO 2 L/ha			Mejora la cuaja y formación del tubo polínico.
	COBRE 1 L/ha		Aplicar solo o mezclado junto al fungicida. Sanidad del árbol
		COBRE 1 L/ha	Aplicar antes de caída de hoja.

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.

ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

RECOMENDACIÓN: En semillero atomizar FERTUM Root, 2 L/ha en post emergencia apenas se presente una superficie foliar para la absorción. Repetir 1-3 días antes del trasplante.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

NOTA: FERTUM® Root se vende en Chile como FARTUM® Germinal. FARTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.

DOSIS: En grandes extensiones (L/ha) aplicar con buen mojamiento. En pequeñas extensiones diluir cada cc indicado en 100 L de agua y regar.

