



GUÍA DE APLICACIÓN
ARÁNDANO


BROTACIÓN	PREFLORACIÓN	CUAJA DE FRUTO	CRECIMIENTO FRUTA	COSECHA POST COSECHA	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® Root 1 L. en 100 L. de agua					En plantas de vivero y recién trasplantadas. Otorga más vigor a las plántulas.
FERTUM® Foliar 5 L/ha.		FERTUM® Foliar 8 L/ha.		FERTUM® Foliar 5 L/ha.	Estimula el desarrollo. Aplicar en inicio de brotación; cuaja de frutos y reservas próxima temporada.
			FERTUM® Silicium PK 6 L/ha.		En cambio de color del fruto.

BROTACIÓN	PINTA DE FRUTOS	CUAJA DE FRUTOS	CRECIMIENTO FRUTA	COSECHA POST COSECHA	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
	MULTIMINERAL 5 l/HA				Hacer 1 aplicación. Incrementa la cuaja y calibre Recomendación probada
	CALCIO 5 L/ha				1 aplicación. Mejora la formación del fruto. Incrementa la cuaja y calibre Recomendación probada

OTROS PRODUCTOS FERTUM® RECOMENDADOS:

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.

	MAXBORO 2 l/ha			MAXBORO 2 l/ha	Desde botón floral hasta caída de pétalos, cada 10 días. En post cosecha con hojas verdes. Transfiere azúcares y adelanta la dormancia.
			COPPER 0,75 L/ha	COPPER 0,75 L/ha	Estimula resistencia al estrés y enfermedades fungosas (Botrytis Cynerea,y Pseudomonas spp.)
		POTASSIUM 2-3 L/ha			Mejora calidad del fruto y su post cosecha. Aplicar en fruto cuajado. 2 aplicaciones, cada 15 días.



ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

NOTA: FERTUM® Root se vende en Chile como FARTUM® Germinal. FARTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.

contacto@fartum.cl

www.fartum.cl

info@fertum.cl

www.fertum.cl