




BROTACIÓN	FECUNDACIÓN	POST COSECHA	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® Silicium PK 8 L/ha.			En inicio de primavera. Fines de set y oct (Hemisferio sur). Potencia la brotación
	FERTUM® Magnesium 3 L/ha.		Aplicar 2 veces en noviembre, para mejorar fecundación (Hemisferio sur).
	FERTUM® Calcio 4 L/ha.		Aplicar en diciembre 2 veces, para dar firmeza a la semilla. (Hemisferio sur).
		FERTUM® Foliar 6 L/ha.	Aplicar en abril -Mayo (HS) Reserva para activación radicular.
		FERTUM Boro Zinc 4 L/ha.	Aplicar en abril -Mayo (HS) Reserva para activación radicular.

**OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:**

**USO PROBADO**

BROTACIÓN	FECUNDACIÓN	POST COSECHA	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
		FERTUM ROOT 6 L/ha	Aplicar en reemplazo de FERTUM Foliar.

**AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO \***



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



**ADVERTENCIA:** Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

\* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

**NOTA:** FERTUM® Root se vende en Chile como FARTUM® Germinal. FARTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.

[contacto@fartum.cl](mailto:contacto@fartum.cl)

[www.fartum.cl](http://www.fartum.cl)

[info@fertum.cl](mailto:info@fertum.cl)

[www.fertum.cl](http://www.fertum.cl)