



GUÍA DE APLICACIÓN  
AVENA


PRE SIEMBRA EN SEMILLA	MACOLLA	PRIMER NUDO	INICIO FLORACIÓN	COSECHA	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® Root 1 L. en 200 Kg. de semilla					Estimula una germinación homogénea de la semilla. Aplicar en tratamiento de semilla junto al fungicida o inoculantes.
	FERTUM® Foliar 2 L/ha.				SOLO 1 APLICACIÓN Entre macolla y primer nudo.

**OTROS PRODUCTOS FERTUM® RECOMENDADOS:**

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.

INICIO MACOLLA	MACOLLA	PRIMER NUDO	INICIO FLORACIÓN	COSECHA	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
CALCIO 3-4 L/ha		CALCIO 3-4 L/ha			Corrige deficiencias de Calcio.
	MAXZINC 2 L/ha			MAXZINC 2 L/ha	Mejora brotación y calidad de la macolla. Previene enfermedades fungosas. Aplicar según recomendación de un profesional.
		MAXBORO 1-2 L/ha			Solo si hay deficiencias, al inicio de aparición de la espiga, entre hojas e inicio del escañado. Usar dosis mínimas en deficiencias leves y máxima en severas.

**AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO \***



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



**ADVERTENCIA:** Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

\* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

**NOTA:** FERTUM® Root se vende en Chile como FARTUM® Germinal. FARTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.

[contacto@fartum.cl](mailto:contacto@fartum.cl)

[www.fartum.cl](http://www.fartum.cl)

[info@fertum.cl](mailto:info@fertum.cl)

[www.fertum.cl](http://www.fertum.cl)