

GUÍA DE APLICACIÓN
CASTAÑO



RECESO INVERNAL	YEMA HINCHADA	INICIO FLORACIÓN	FLORACIÓN set - oct	PLENA FLORACIÓN	FIN FLORACIÓN	POST COSECHA	CAÍDA DE HOJAS	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
COPPER 0,80 L/ha - 50 cc								Aplicar entre may-ago (Hemisferio sur). Cancer bacterial Cada 30 días en recesión invernal y caída de hojas.
	COPPER 1 L/ha - 50 cc						COPPER 0,80 L/ha - 50 cc	Salidas de invierno, yema hinchada a inicio botón blanco. En abril 2 aplicaciones con 20 % y 80 % caída de hojas.
	MAXBORO 5 L/ha - 250 cc							Con antecedentes de poca cuaja, repetir en plena flor.
		CALCIBORO 2L/ha - 100 cc						Como estimulante foliar, para firmeza flor.
				CALCIO 6 L/ha - 300 cc	CALCIO 6 L/ha - 300 cc			Aplicar fitoregulador hormonal con plena flor en octubre (Hemisferio sur). En noviembre para firmeza del fruto.
		FOLIAR 2 L/ha -100 cc	FOLIAR 9 L/ha - 100 cc	FOLIAR 2 L/ha - 100 cc	FOLIAR 2 L/ha - 100 cc			Aplicar fitoregulador hormonal desde inicio floración. set-oct (Hemisferio sur). Mejora calibre y firmeza.
			FOSFITOR-K 3 L/ha - 160 cc	FOSFITOR-K 6 L/ha - 300 cc	FOSFITOR-K 6 L/ha - 300 cc	FOSFITOR-K 6 L/ha - 300 cc		Aplicación en set-oct (Hemisferio sur). Fertilización foliar hasta post cosecha

ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

NOTA: FERTUM® Root se vende en Chile como FARTUM® Germinal. FARTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.

DOSIS: En grandes extensiones (L/ha) aplicar con mojado de 2.000 L para cada ha. En pequeñas extensiones diluir cada cc indicado en 100 L de agua y regar.



+ 11 - 15 %

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *

TESTIGO

CON FERTUM

* Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.