



GUÍA DE APLICACIÓN
CEREZO


| BOTÓN FLORAL | INICIO FLORACIÓN | PLENA FLOR CUAJA | QUIEBRE COLOR PINTA | PRE COSECHA | OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| FERTUM® Root 2 L/há. | | | | FERTUM® Root 2 L/há. | Aplicar al suelo directamente, en periodos de crecimiento radicular. |
| | FERTUM® Foliar 4 L/ha. | | FERTUM® Foliar 4 L/ha. | | Atomizar con 50 % de floración a caída de pétalos. Opcional en cambio de color. Repetir 14 días después. |
| | | Fertum Silicium PK 4 L /ha. | | | Potencia la cuaja de frutos. |

OTROS PRODUCTOS FERTUM® RECOMENDADOS:

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.

| RECESO A PUNTAS VERDES | BOTÓN FLORAL | PLENA FLOR A CUAJA | PRE COSECHA | POST COSECHA | OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES |
|------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| | | | | FOSFITOR-K 4 - 5 L/ha | Aplicar al follaje en máximo crecimiento de raíces. Prevención de hongos y bacterias. Previene Phytopthora. |
| | | CALCIO 2 - 3 L/ha | | | Aplicar 10 días después de cuaja, para dar consistencia a los frutos. También 6-8 semanas antes de cosecha. |
| | BOROZINCO 3 L/ha | | | | Mejora la floración y la cuaja y entrega nutrición al tubo polínico. |
| | | MAXBORO 2 L/ha | | | Firmeza del fruto. Aplicar desde inicio del endurecimiento del carozo. |
| COPPER 0,75 L/ha | | COPPER 0,75 L/ha | | COPPER 0,75 L/ha | Previene Cáncer Bacterial y Cancrosis. En post cuaja repetir cada 10 días. En post cosecha actúa como RSA |
| | | | POTASSIUM 3-4 L/ha | | Mejor calibre y color de fruto. Aplicar al follaje con abundante cobertura, 10 días antes de la cosecha. |
| | | MULTIMINERAL 2 -3 L/ha | | | Mejora cuaja y calibre de frutos. Aplicar después de floración. |

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

NOTA: FERTUM® Root se vende en Chile como FARTUM® Germinal. FARTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.

contacto@fartum.cl

www.fartum.cl

info@fertum.cl

www.fertum.cl