



GUÍA DE APLICACIÓN
FLORES DE CORTE

INICIO DE BROTAÇÃO	DESBOTONE			OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® Foliar 3 L/ha.				Aplicar al inicio de brotación lateral de yemas. Induce ramificación de yemas laterales
	FERTUM® Silicium PK 4 L/ha.			Aplicar después del desbotone de la flor apical. Mejora el peso y vida post cosecha.

GUÍA DE APLICACIÓN
FLORES BULBOSAS

ANTES DE LA PLANTACIÓN	DESARROLLO VEGETATIVO	ROSETA O FLORACIÓN		OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® Root 1 L. en 50 L. de agua				Solución al 2 %. Sumergir los bulbos por 35 minutos antes de plantar.
	FERTUM® Foliar 3 L/ha.			Aplicar al inicio del desarrollo vegetativo. Estimula el desarrollo.
		FERTUM® Silicium PK 4 L/ha.		Aplicar en estado de roseta o floración y según el periodo elegido. Incentiva floración y aumenta la vida post cosecha.

ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

NOTA: FERTUM® Root se vende en Chile como FARTUM® Germinal. FARTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.



AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *

Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.

