

GUÍA DE APLICACIÓN
HABA




TRATAMIENTO SEMILLA Y EMERGENCIA	PREFLORACIÓN O BOTÓN FLORAL	DESARROLLO DE VAINAS	LLENADO DE GRANOS	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® Root 1 L. en 100 Kg. De semilla				Aplicar junto al fungicida, promueve el enraizamiento del cultivo. En riego de germinación, en plantas de 1 semana de emergidas
	FERTUM® Foliar 3 L/ha.	FERTUM® Foliar 3 L/ha.		Aplicar en los primeros botones florales. Incrementa la clorofila. En riego de auxilio en formación de granos. Calidad y amarre.
			FERTUM Silicum PK 5 L/há	Protege y ayuda al desarrollo de granos.

OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.

	DESARROLLO DE VAINAS	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
	CALCYBORO 2 L/ha	Aplicar 15 días después de cuaja. Es recomendable

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

NOTA: FERTUM® Root se vende en Chile como FARTUM® Germinal. FARTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.

contacto@fartum.cl

www.fartum.cl

info@fertum.cl

www.fertum.cl