

GUÍA DE APLICACIÓN
LUPINO




PRE SIEMBRA EN SEMILLA	DESPUÉS DE LA DE EMERGENCIA	FIN FLUORESCENCIA DEL TALLO PRINCIPAL	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM ® Root 1 L. en 100 Kg. de semilla			Estimula una germinación homogénea de la semilla. Aplicar en tratamiento de semilla junto al fungicida o inoculantes.
	FERTUM ® Foliar 2 L/ha		Aplicar 14 - 21 días después de la emergencia. Solo una aplicación.
		FERTUM Silicium PK 3 L/Ha.	En inicio de Fluorescencia apical. Refuerza formación de frutos.

OTROS PRODUCTOS FERTUM ® RECOMENDADOS:

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.

BROTACIÓN	DESARROLLO VEGETATIVO	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
MAGNESIO 1 L/ha		Activa el crecimiento inicial.
MAXZINC 1 L/ha		Activa el crecimiento inicial. Maduración de cloroplastos.
	COBRE 0,75 L/ha	Aplicar 20 días después de brotación, para sanidad de las plantas. Repetir 60 días después, por prevención.

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM ® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

NOTA: FERTUM ® Root se vende en Chile como FARTUM ® Germinal. FARTUM ® es marca comercial en Chile y FERTUM ® es marca comercial en los otros países.

contacto@fartum.cl

www.fartum.cl

info@fartum.cl

www.fertum.cl