

GUÍA DE APLICACIÓN
MACADAMIA




	BROTACIÓN	DESARROLLO VEGETATIVO	FLORACIÓN	CUAJA	DESPUÉS DE CUAJA	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® ROOT 1 L/100 L agua						Atomizar el sustrato de la cama de enraizamiento con dilución de 1 L/100 L. Si es por estacas sumergir por 30 s cada una, sin diluir.
	FERTUM® Foliar 2 L/ha	FERTUM® Foliar 2 L/ha		FERTUM® Foliar 2 L/ha		Aplicar desde apertura de yema y repetir 2 a 3 veces cada 2-3 semanas. Diluir en 200-300 L de agua. Promueve el desarrollo de frutos y brotes.
					FERTUM® POTASIO 2 L/ha	Aplicar 30 días después de la cuaja y repetir a los 14 días. Ayuda en la maduración y calibre del fruto.

OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:

BROTACIÓN	DESARROLLO VEGETATIVO	DESPUÉS DE CUAJA	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
MAXBORO 3 L/ha			Mejora la cuaja y formación del tubo polínico.
	MAXHIERRO 3 L/ha		En inducción del desarrollo vegetativo. Disminuye la clorosis.
		CALCIBORO 2 L/ha	Aplicar 10 días después de la cuaja y repetir a las 3 semanas.

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.

ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

RECOMENDACIÓN: En semillero atomizar FERTUM Root, 2 L/ha en post emergencia apenas se presente una superficie foliar para la absorción. Repetir 1-3 días antes del trasplante.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

NOTA: FERTUM® Root se vende en Chile como FARTUM® Germinal. FARTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.

DOSIS: En grandes extensiones (L/ha) aplicar con un máximo de 500 L de agua.



contacto@fartum.cl

www.fartum.cl

info@fertum.cl

www.fertum.cl