

GUÍA DE APLICACIÓN
BELL PEPPER - MORRÓN




ALMÁCIGOS	TRASPLANTE Y ESTABLECIMIENTO	DESARROLLO VEGETATIVO	CUAJA Y DESARROLLO FRUTO	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM ® Root 1 L x 100 L de agua	FERTUM ® Root 4 L/ha			Favorece el crecimiento de raíces. Regar al 1 % con 2 hojas verdaderas. Repetir 7 días después.
		FERTUM ® Foliar 4 L/ha.		En prefloración. E inicio de formación de fruto.
			FERTUM ® Silicium PK 5 L/ha.	Aplicar en desarrollo final del fruto. Mejora el calibre.

OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.

ALMÁCIGOS	TRSPLANTE Y ESTABLECIMIENTO	DESARROLLO VEGETATIVO	CUAJA Y DESARROLLO DE FRUTO	OBJETIVOS Y RCOMENDACIONES
FOSFITOR-K 200 cc/100 L. agua		FOSFITOR-K 2 L/ha		Aplicar en forma preventiva: Estimula resistencia en almácigos. Evita enfermedades fungosas.
		MULTIMINERAL 1 L/ha		Entrega los microelementos que las plantas necesitan. Mejora la cuaja. Aplicar junto a FERTUM Foliar.
		BOROZINCO 2 L/ha		Mejora la cuaja. Aplicar 20 días después del trasplante o brotación.
		CALCYBORO 2 L/ha		Mejora color del fruto. Aplicar 60 días después del trasplante.

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM ® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

NOTA: FERTUM ® Root se vende en Chile como FARTUM ® Germinal. FARTUM ® es marca comercial en Chile y FERTUM ® es marca comercial en los otros países.

contacto@fartum.cl

www.fartum.cl

info@fertum.cl

www.fertum.cl