

GUÍA DE APLICACIÓN
OLIVO




BOTÓN FLORAL	FLORACIÓN CUAJA	POST CUAJA Y DESARROLLO DE FRUTOS	POST COSECHA	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® Root 2 L/ha			FERTUM® Root 2 L/ha	Aplicar al arranque de botón y en post temporada para reserva en próxima cosecha.
	FERTUM® Foliar 4 L/ha.			Entre floración y fruto cuajado. Estimula el crecimiento del fruto y de la planta.
		FERTUM® Silicium PK 5 L/ha.		Aplicar en fruto en desarrollo, para aumentar calibre

OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.

BOTÓN FLORAL	FLORACIÓN CUAJA	DESARROLLO DE FRUTOS	POST COSECHA	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
		FOSFITOR-K 2.3 L/ha	FOSFITOR-K 2.3 L/ha	Aplicar en plantas enfermas Cuello-Raíz. Descalce del cuello y llenar la taza. Repetir 30 días después, de ser necesario.
MAXZINC 2 L/ha	MAXZINC 2 L/ha			Aplicar a partir del inicio del flujo vegetativo y en primavera, cada 10 días.
MAXBORO 1 L/ha	MAXBORO 1 L/ha		MAXBORO 1 L/ha	Aplicar en brotación, apertura de cáliz y post floración (2 veces). En post cosecha con hojas verdes y activas.
CALCIO 2 L/ha				Aplicar 10 - 15 días antes de floración
	POTASSIUM 2-3 L/ha	POTASSIUM 2-3 L/ha		A partir del endurecimiento del carozo. Repetir cada 15-20 días. Mejora calibre de los frutos.

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

NOTA: FERTUM® Root se vende en Chile como FARTUM® Germinal. FARTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.

contacto@fartum.cl

www.fartum.cl

info@fertum.cl

www.fertum.cl