




DESARROLLO INICIAL DE RAÍCES	BROTACIÓN	INICIO FLORACIÓN	FRUTO CUAJADO	POST COSECHA	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® Root 4 L/ha				FERTUM® Root 4 L/ha	Para el sostenimiento de la funcionalidad de la raíz. En frutos recién cuajados. También 20-40 días de post cuaja.
	FERTUM® Foliar 6 L/ha.	FERTUM® Foliar 6 L/ha.			Aplicar en brotación e inicio de floración
			FERTUM Silicium PK 5 L/ha.		Desarrollo del fruto y uniformar calibre

**OTROS PRODUCTOS FERTUM® RECOMENDADOS:**

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.

DESARROLLO BOTÓN FLORAL	BROTACIÓN	PANÍCULA EN CRECIMIENTO	INICIO FLORACIÓN	FRUTO CUAJADO	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
				CALCIO 2 L/ha	Para firmeza del fruto y calidad. Aplicar 20-40 días post cuaja y en frutos cuajados. Repetir 100-120 días.
	BOROZINCO 2 L/ha			BOROZINCO 2 L/ha	Antes del flush de crecimiento vegetativo y 20-40 días post cuaja. Mejora estabilidad de la planta y crecimientos desuniformes.
		MAGNESIUM 2 L/ha			Mejora el rendimiento y la calidad. Evita la clorosis marginal en V invertida (hojas antiguas).
	MAXHIERRO 2-3 L/ha				Ayuda a la síntesis de la molécula de la clorofila.. Evita clorosis internerval (hojas nuevas)

**AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO \***



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



**ADVERTENCIA:** Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

\* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

**NOTA:** FERTUM® Root se vende en Chile como FARTUM® Germinal. FARTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.

[contacto@fartum.cl](mailto:contacto@fartum.cl)

[www.fartum.cl](http://www.fartum.cl)

[info@fertum.cl](mailto:info@fertum.cl)

[www.fertum.cl](http://www.fertum.cl)