




ALMÁCIGOS	TRASPLANTE Y ESTABLECIMIENTO	DESARROLLO VEGETATIVO	CUAJA Y DESARROLLO FRUTO	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® Root 1 L/ 100 L de Agua	FERTUM® Root 4 L/ha			Favorece el crecimiento de raíces. Aplicar directo al sustrato. Aplicar 5 días post trasplante o 3 semanas post germinación.
		FERTUM® Foliar 3 L/ha.	FERTUM® Foliar 3 L/ha.	Aplicar en floración e inicio de cuaja. Repetir cada 21 días hasta fin de la cosecha.
			FERTUM Silicium PK 5 L/ha.	Aplicar en desarrollo final del fruto, para mejorar calibre.

OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.

ALMÁCIGOS	TRASPLANTE Y ESTABLECIMIENTO	DESARROLLO VEGETATIVO	CUAJA Y DESARROLLO FRUTO	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FOSFITOR-K 250 cc/100 L. agua	FOSFITOR-K 2 L/ha			Estimula la resistencia en almácigos. Usar con 2 hojas verdaderas. Evita enfermedades fungosas y bacterianas. Aplicación preventiva.
	MAGNESSIUM 1 L/ha			Mejora la función de la clorofila. Aplicar 20 días después del trasplante, con buena cobertura si se detectan deficiencia.
			MULTIMINERAL 2 L/ha	Mejora la cuaja y otorga todos los microelementos que el cultivo necesita. Aplicar junto al FERTUM Foliar.

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

NOTA: FERTUM® Root se vende en Chile como FARTUM® Germinal. FARTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.

contacto@fartum.cl

www.fartum.cl

info@fartum.cl

www.fertum.cl