

GUÍA DE APLICACIÓN
PEPINO




ALMÁCIGOS	TRASPLANTE Y ESTABLECIMIENTO	DESARROLLO VEGETATIVO	CUAJA Y DESARROLLO FRUTO	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® Root 1 L/ 100 L de agua	FERTUM® Root 4 L/ha			Favorece el crecimiento de raíces. Regar al 1 % con 2 hojas verdaderas. Repetir 7 días después.
	FERTUM® Foliar 4 L/ha.	FERTUM® Foliar 4 L/ha.		Aplicar 5 días post trasplante. Entre floración e inicio de formación de fruto.
			FERTUM Silicium PK 5 L/ha.	Desarrollo final del fruto y mejor calibre.

OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.

ALMÁCIGOS	TRASPLANTE Y ESTABLECIMIENTO	DESARROLLO VEGETATIVO	CUAJA Y DESARROLLO FRUTO	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FOSFITOR-K 250 cc/100 L. agua		FOSFITOR-K 2 L/ha		Estimula la resistencia en almácigos. Usar con 2 hojas verdaderas. Evita enfermedades fungosas y bacterianas. Aplicación preventiva.
	MAGNESSIUM 300 cc/100 L.	MAGNESSIUM 1 L/ha		Mejora la función de la clorofila. Aplicar 20 días después del trasplante, con buena cobertura.
			BOROZINCO 2 L/ha	Mejora la cuaja. Aplicar 30 días después del trasplante o brotación
			CALCYBORO 2 L/ha	Mejora la firmeza del fruto. Aplicar 40 días después del trasplante.
			POTASSIUM 2 - 3 L/ha	Mejora calidad del fruto: firmeza y llenado. Aplicar 70 días después del trasplante o brotación.

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

NOTA: FERTUM® Root se vende en Chile como FARTUM® Germinal. FARTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.

contacto@fartum.cl

www.fartum.cl

info@fertum.cl

www.fertum.cl