



INVIERNO (Hemisferio Sur)	SETIEMBRE A MARZO (HS)		OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® Foliar 2 L/ha.			Cada 30 días con dilución al 1 % y 10 L de agua por m2. Induce ramificación de yemas laterales
FERTUM® Silicium PK 2 L/ha.			Cada 30 días con dilución al 1 % y 10 L de agua por m2. Mejora el peso y vida post cosecha.
	FERTUM® MAGNESIO 1 L/ha		Cada 30 días con dilución al 0,5 % y 10 L de agua por m2. Aumenta la producción de rosas. Mejora el color de flores y hojas.

OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:

FERTUM® CALCIO 1 L/ha			Cada 30 días con dilución al 0,5 % y 10 L de agua por m2. Para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Resistencia a enfermedades fungosas.
	FERTUM® PARDA 3 3 L/ha		Cada 30 días con dilución al 1,5 % y 10 L de agua por m2. Adición de materia orgánica. Ac. Húmicos y Fúlvicos.
	FERTUM® MAXHIERRO 1 L/ha		Cada 30 días con dilución al 0,5 % y 10 L de agua por m2. Usar si el pH del suelo es alto Controla los parámetros de pH. Un pH ácido en torno a 6 ayuda a la absorción foliar.

ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *

Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.

