



GUÍA DE APLICACIÓN
TOMATE SALADETTE


ALMÁCIGOS	TRASPLANTE Y DESARROLLO INICIAL	CRECIMIENTO VEGETATIVO	FLORACIÓN, CUAJA Y DESARROLLO DE FRUTOS	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM ® Root 2 cc x celda o regar al 1 %	FERTUM ® Root 2-3 L./ha. Regar al 1 %			En celda o camadas regar 1 : 100 L. para mejorar el estrés en el trasplante. Promueve el enraizamiento.
		FERTUM ® Foliar 5L/ha.		Aplicar en Prefloración. En inicio de formación de frutos. y después de cada cosecha.
			Fertum Silicium PK 5 L/ha	Vigoriza la planta y protege de enfermedades.

OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.

ALMÁCIGOS	TRASPLANTE	CRECIMIENTO VEGETATIVO	FORMACIÓN DE FRUTO	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FOSFITOR -K 250 cc/100 L. agua				Estimula resistencia a caída de almácigos. Aplicar en forma preventiva y repetir cada 8 días.
			CALCIO 1 L/ha	Mejora la fotosíntesis y consistencia del fruto. Aplicar al inicio de formación de fruto. Repetir 15-20 días después.
		MULTIMINERAL 1 L/ha		Entrega los microelementos y hormonas vegetales para promover el desarrollo del cultivo. Aplicar junto con FERTUM Foliar.

AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO *



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



ADVERTENCIA: Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM ® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

NOTA: FERTUM ® Root se vende en Chile como FARTUM ® Germinal. FARTUM ® es marca comercial en Chile y FERTUM ® es marca comercial en los otros países.

contacto@fartum.cl

www.fartum.cl

info@fertum.cl

www.fertum.cl